

# Eine Vorarbeit für eine Tabelle der palaearktischen Cryptorrhynchiden.

Geliefert von Paul Meyer in Hamburg.

Genus *Torneuma* Wollaston.

## I. Species europaeae.

- 1'' Prothorace carinula abbreviata instructo, elytris basi recte truncatis. Longitudine sine rostro  $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$  mm.
- 2'' Humeris rotundatis.
- 3'' Thorax dorso obsolete carinulatus, elytra subtiliter punctato-striata. Liguria (Nizza, Genua): **Grouvellei** Desbr.
- 3' Thorax dorso sat distincte carinulatus, elytra fortiter punctato-striata. Sardinia: **Raymondi** Perris.
- 2' Humeris prominulis, angulatim subproductis, elytra medio criter punctato-striata. Corsica: **Damryi** Perris.
- 1' Prothorace haud carinulato.
- 4'' Humeris prominulis, angulatim subproductis.
- 5'' Thorax latior, elytra basi sat bisinuata, dorso fortiter punctato-striata. Long.  $2\frac{1}{2}$ —3 mm. Sicilia: **deplanatum** Hmpe.\*)
- 5' Thorax angustior, elytra basi subsinuata, dorso mediocriter punctato-striata. Long. 2— $2\frac{1}{2}$  mm. **sardoum** Desbr.
- 4' Humeris rotundatis, elytris basi recte truncatis.
- 6'' Elytra subtiliter punctato-striata. Long. 2— $2\frac{1}{2}$  mm. Sicilia: **siculum** Rag.
- 6' Elytra fortissime punctato-striata. Long.  $1\frac{1}{2}$ —2 mm. Sardinia: **minutum** nov. spec.\*\*)

\*) Synonyma: *planidorse* Frm., *Rosaliae* Rottbg., *setiferum* Bris.

\*\*) Descriptio: *Oblongum, angustatum, subparallelum, subdepressum, fusco-ferrugineum, prothorace elongato, lateribus modice rotundato-ampliato, supra deplanato, fortiter ac dense ruguloso-punctato, elytris oblongis, basi prothorace haud sensim latioribus sed mox dilatatis, ad apicem attenuatis, apice ipso rotundato, fortiter punctato-striatis, interstitiis angustioribus, subplanis, subtiliter punctulatis.*

**II. Species algeriae.\*)**

- 1<sup>''</sup> Elytra aequalia, parum convexa, basi fere recte truncata, humeris rotundatis, striato-punctata, interstitiis aequalibus, parce uni-seriatim punctulatis ac setulosis. Long. 2—2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mm. Bou-Saada (Oberthür), Philippeville, St. Charles (*Theryi* Desbr.): **Oberthüri** Frm.
- 1' Elytra basi medio prominente, utrinque sinuata, humeris angulatim prominentibus, in dorso deplanata, striis (suturali impressa), distincte punctulatis, interstitiis non elevatis, densissime punctulatis, vix distincte setulosis. Long. 2 mm. Philippeville, St. Charles. **suplanum** Desbr.

**III. Species maroccae.\*\*)**

- 1<sup>''</sup> Latiusculum, prothorace haud carinulato, antice valde ac paullatim, postice minus angustato, elytris prothorace latioribus (humeris prominulis), striis obsolete-punctatis, interstitiis subtiliter rugosis, seriatim setosis. Long. 3 mm, lat. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> mm. Tanger: **robustum** Dieck.
- 1' Parallelum, prothorace sat distincte carinulato, hoc antice angustato, postice valde bisinuato, elytris prothorace paululo latioribus, punctato-striatis, interstitiis seriatim punctulatis, apicem versus brevissime setulosis. Long. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mm. Tanger: **tingitanum** Dieck.

**IV. Species syriacae.**

Oblongum, subparallellum, subdepressum, fusco-ferrugineum, nitidulum, pube fere inconspicua sparsim obtectum, prothorace latitudine paullo longiore, antice paullo magis angustato, coleopteris perparum angustiore, deplanato, punctato, basi in medio sinuato, angulis posticis obtuso-rotundatis.

- 1<sup>''</sup> Longitudine sine rostro 3—3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mm. Elytris ovalibus, antice parum deplanatis, postice convexis, prope basin distincte constrictis, angulis humeralibus prominulis, basi fortiter bisinuatis, lateribus rotundatis, supra subtiliter punctato-striatis, stria suturali magis impressa, interstitiis latioribus, subti-

\*) Unbekannt blieben mir leider die Arten: *Torneuma orbatum* Woll., *longicolle* Tourn., *subterraneum* et *convexiusculum* Fairm.

\*\*\*) Mir blieb unbekannt: *T. strigiostre* Frm., gleichfalls von Tanger, sowie die Art *caecum* Woll., worauf die Gattung *Torneuma* begründet worden ist. Letztere von Madeira.

lissime seriatim punctulatis et subpuberulis, setulis vix perspicuis, pedibus elongatis. Beirut (Appl): **syriacum** Rtrr.

- 1' Longitudine sine rostro 2 mm, lat.  $\frac{4}{6}$  mm. Elytris (quam tota superficie) deplanatis, prope basin parum angustatis (non constrictis), angulis humeralibus parum prominulis, basi leviter bisinnatis, lateribus parallelis, supra mediocriter punctato-striatis, stria suturali haud magis impressa, interstitiis angustioribus, densissime seriatim punctulatis et subpuberulis, setulis vix perspicuis, pedibus mediocribus Chaifa.

**Simoni** nov. sp.\*)

---

\*) Exemplar unicum ab amico Domino von Heyden meae collectioni dono datum, a Domino Simon, in ejus honorem hanc speciem singularem nominavi, repertum.

---

## Synonymisches über die Coleopteren-Gattung *Danacaea* Lap.

Von J. Prochaska in Mistek (Mähren).

*Danacaea pallidipalpis* Abeille, Echange, 1894. 93 = *Reyi* Proch.

*D. opacula* Ab. ist eine Art die zwischen *cusanensis* und *tomentosa* zu stellen wäre; sie dürfte aber auf ein kleines Exemplar der *tomentosa* gegründet sein.

*D. minuta* Pic = *aphytoides* Schilsky-Proch.

*D. Leprieuri* Pic ist höchstens eine Var. von *Poupillieri* mit schwacher Verdunkelung der Fühlerspitze.

*D. nigritarsis* Küst. var. *longipilis* Pic ist zu verwerfen.

*D. viridescens* Pic = *distincta* Luc.; der Autor hält für *distincta* die *aurichalcea* Küst., welche ihm fehlt.

---